

Jeg har nu nøje gennemgaaet alle Posterne og er Resultatet egentlig at gøres det Hele op, er der ingen nævneværdig Difference mellem de to Anstalter.

Med Hensyn til de 3 Sorter Mel gik jeg ned til Justesen og spurgte ham, hvorledes disse Priser kunde fremkomme. Han var af den Formening, at Priserne maatte være pr. $\frac{1}{2}$ kg; i hvert Fald havde han i 19/13-14 og 14/15 ikke en gros solgt disse Melsorter paa langt nær saa billigt, saa en Fejl maatte der paa en eller anden Maade foreligge, selv om det er Licitationsvarer. Under almindelige Forhold, udtalte han, fremkommer der jo sommetider særlig af disse Melsorter meget billige Varer, der jo nok findes Aftagere, men saa billige, at de i detail kan sælges til de anførte Priser, havde han ikke tænkt sig; det maatte være en meget ringe Vare.

Der er enkelte Regnefejl som f. Eks. paa Cacao Fiskeboller har været dyrere end hos Aarhus undtagen 14/15. Margarine til den Pris i Indkøb har jeg ikke haft.

Jeg har regnet ud, at paa Licitationen har der været levnet Købmanden en Avance af c: 4-5% og paa de andre Varer, der jo drejer sig om meget mindre Beløb c: 10-12% brutto.

Naar De faar et Kontor, vil Opretholdelsen af samme koste c: 10% af Vareindkøbene altsaa ren Til sætning i c: 4% foruden Tabet ved Transportudgifter, Synd ved Lagring etc.

Meddelelser fra Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg.

(Overlæge: Prof., Dr. med. S. Bang).

VIII.

Sammenlignende Forsøg over Fordøjeligheden af Smør og Margarine.

Ved

Cand. pharm. E. Grav.

PAA Opfordring af min Chef, Hr. Professor Dr. med. S. Bang, har jeg foretaget nogle Forsøg over, hvorvidt Patienterne paa Silkeborg Sanatorium fordøjede Smør og Margarine lige godt.

Uden at komme nærmere ind paa den hidtil foreliggende Litteratur om dette Æmne skal jeg kun bemærke, at de noget varierende Resultater, hvortil man hidtil er kommen, synes i al Fald tildels at bero paa den Kost, man har givet under Forsøgene. Saaledes fandt Hultgren og Landermann (Zeitschrift für Untersuch. d. Nahrungs- und Genussmittel, 1899) ved 5 Selvforsøg, hvor de kun nød Rugbrød, Rødvin og Vand foruden Fedtstofferne:

			Fedt % tabt.
Hultgren	Margarine:	100,0	4,58
	Smør:	104,8	5,72
Landermann	Margarine:	125,5	7,81
	Smør:	146,8	6,40

Forsøg af denne Art lader sig ikke med Sikkerhed bruge til deraf at drage i det praktiske Liv anvendelige Slutninger, idet en saa ensartet og usædvanlig Kost let vil hidføre abnorme Absorptionsforhold. Nærmere ved de nævnte Betingelser komme saadanne Forsøg som H. Lührigs (Zeitschrift f. Untersuch. d. Nahrungs- und Genussmittel, 1899.) Lührig fandt i en Række Forsøg paa mere sammensat Kost (Kød, Brød, Kartofler, Linser, Bønner, Tropon), at der af 116,4 Gram indtaget Smør i Gennemsnit udskiltes 2,99%, af 120,89 Gram Margarine 3,23%, hvoraf han drager den Slutning, at Smør og Margarine praktisk udnytttes paa samme Maade.

Skal man besvare det bestemte Spørgsmaal, om det er forsvarligt at anvende

Margarine paa Sanatorierne, nødes man altsaa til at gøre direkte Forsøg, ikke blot med den paa Sanatoriet faktisk anvendte Kost, men ogsaa med selve Patienterne. Ganske særlig Betydning har dette derved, at saa mange af disse Patienter lide af Mave- og Tarmforstyrrelser, og skulde der i den daglige Husholdning gøres Undtagelser for alle disse, vilde det næppe være praktisk at anvende Margarine for de øvrige.

Som det af nedenstaaende Skema ses, er Patienter med Fordøjelselidelser særlig fyldig repræsenterede i mine Forsøg.

Forsøgsnummer	Forsøgsindivid.	Fordøjelsesorganer	HCl.	Feber	Kost
I	Sund	Sund	+	÷	Almindelig
II	Ftisiker	Sund	+	÷	—
III	—	Gastritis	÷	÷	—
IV	—	Enteritis	nedsat	+	—
V	—	—	+	÷	Let Kost + Mælk
VI	—	—	+	÷	—
VII	—	—	+	+	Let Kost
VIII	—	—	÷	l. g.	—
IX	—	—	nedsat	+	—

Let Kost: Fars, Fisk, fersk Kød, Kartoffelmos og Franskbrød.

Forsøg I er Kontrollforsøg foretaget med mig selv, for de øvrige Forsøgsindivider følger her en kortfattet Sygehistorie:

Forsøg II: 17aarig Murerlærling. III. Stadium. Betydelig Bedring under Sanatorieopholdet ($^{12}/_{11}$ 08— $^{14}/_{11}$ 10). + TB. Vægt 59,6—69,9. Laryngitis tuberc. l. g. Fordøjelsen normal.

Forsøg III: 41aarig Møbelpolerer. III. Stadium (skleroserende, kronisk Proces). Betydelig Bedring under Sanatorieopholdet ($^{11}/_{3}$ 09— $^{1}/_{2}$ 10). Afebril. ÷ TB. Let kronisk Alkoholisme. Under Opholdet her klagede han stadig over mindre god Appetit (tog dog paa fra 64,1—75 Kilo), Meteorisme, Smerter i Cardia, Pyrosis, træg Afføring. Mavefunktionsundersøgelsen viste ÷ HCl, Totalaciditet 30.

Forsøg IV og IX: 19aarig Kommis. III. Stadium ($^{6}/_{7}$ 09— $^{16}/_{4}$ 10). Tarmtilfælde siden 15 Aars Alderen med tiltagende Tilbøjelighed til Diarrhoe. Lungetilfældet begyndte $^{1}/_{2}$ Aar før Indlæggelsen. Under hele Opholdet her stadig sengeliggende med Temperatur nær 38. Til Stadighed tynd eller i det mindste lind Afføring, i Reglen 2—3 Gange daglig, med undertiden ret stærke Smerter i Underlivet. Utvivlsom Tarmtuberkulose. Stadig paa Diæt. Vægt 53,8—59 Kilo. Fri HCl 5—10, Totalaciditet 45.

Forsøg V: 21aarig Tjenestekarl. III. Stadium. Afebril. + TB. Pleuritis 4 Aar før Indlæggelsen, iøvrigt rask til 3 Maaneder før Indlæggelsen ($^{23}/_{6}$ 08). Chronisk Laryngitis. Stærk Vægttiltagen fra Indlæggelsen indtil Begyndel-

sen af November s. A., da der ret pludselig begyndte en Diarrhoe, der holdt sig trods let Kost og forskellige Medicamina indtil Udskrivningen ($^{4}/_{4}$ 09), omend i aftagende Grad. Underlivet naturligt. Formentlig Tarmtuberkulose.

Forsøg VI: 19aarig Snedkerlærling. II. Stadium. Afebril. + TB. Tuberkulosen begyndte ca. 1 Maaned før Indlæggelsen. Vægt ved Indlæggelsen (d. $^{1}/_{5}$ 08) 62,2 Kilo, ved Udskrivningen (d. $^{19}/_{4}$ 09) 60,8 Kilo. Lungeaffektionen under Sanatorieopholdet kendelig bedre, men han generedes under hele Opholdet af Underlivstilfælde: Tilbøjelighed til Obstipation, af og til vekslende med misfarvet, lind Afføring, af og til Meteorisme, næsten stadig Smerter i Underlivet, især i h. fossa iliaca, hvor han stundom var øm for Tryk. Af og til Kvalme, enkelte Gange Opkastning, stadig ringe Appetit, i Reglen Vægttab. Han var under hele Opholdet paa »let Kost«. Mavefunktionsundersøgelse d. $^{26}/_{5}$ 08 viste HCl 29, T. A. 50. Den objektive Undersøgelse af Underlivet viste stadig naturlige Forhold. — Rimeligvis begyndende Tarmtuberkulose.

Forsøg VII: 26aarig Stolemager. III. Stadium. Sygdommen begyndte et Par Maaneder før Indlæggelsen. Nogen Bedring under Opholdet her ($^{10}/_{3}$ 09— $^{30}/_{9}$ 09). + TB. Tiltog fra 56,2 til 61,8 Kilo. Indkom med Feber og var som Følge deraf sengeliggende indtil $^{8}/_{5}$ samt $^{24}/_{5}$ — $^{27}/_{6}$, $^{2}/_{7}$ — $^{20}/_{7}$, $^{24}/_{8}$ — $^{28}/_{8}$; Diazoreaktion under hele Opholdet. Havde haft Diarrhoe længere Tid før Indlæggelsen. Her var Afføringen stadig enten tynd eller lind, flere Gange om Dagen, kun forbigaaende fastere. Af og til Smerter i Underlivet, en enkelt Gang saa voldsomt, at han maatte have gtt. roseæ; af og til Cardialgi og Meteorisme. Underlivet viste intet objektivt abnormt. — Tarmtuberkulose.

Forsøg VIII: 41aarig Lærer. Indlagt $^{14}/_{9}$ 09. II. Stadium. Fleraarig, kronisk forløbende Ftise. Tuberkuløs Epididymitis for 1 Aar siden (Exstirpatio). Stadig subfebril. Afføringen i Reglen lind; saa snart han ikke holder Diæt, bliver den tynd. Vægten svingende, i det hele uforandret. Meget neurasthenisk. — Mavefunktionsundersøgelsen: ÷ HCl, T. A. 30.

Af Maden toges Stikprøver af hver enkelt Ret, der vejedes, Prøverne tørredes sammen med Sand og ekstraheredes i Krayenbühls Apparat. Hele Fæcesmængden tørredes og pulveriseredes sammen med Sand, og en udtagen Prøve ekstraheredes. Hver Prøve ekstraheredes for en Sikkerheds Skyld i 3 Dage, flere Forsøg godtgjorde, at 2 Dage var tilstrækkelig. Til Ekstraktionen anvendtes absolut ren og vandfri Æther. Fedtsyremængden, i det af Fæces udtrukne Fedtstof, titreredes med $^{1}/_{10}$ normal KOH og er paa nedenstaaende Skema angivet i den Mængde 100 % Svovlsyre, der svarer til den forbrugte Mængde KOH.

Hver Patient var 3 Dage paa Forsøg med Margarine og de 3 derpaa følgende med Smør. Til Forsøg II var Margارينen ufarvet, til de øvrige farvet

som Smørret. Farvningen foretoges for at skjule, hvad der var Smør, og hvad der var Margarine. Ingen af Forsøgspersonerne viste sig derefter i Stand til at afgøre, hvad der var hvad. Forsøgsobjekt Nr. VIII troede, at Smørret var Margarine og omvendt.

Paa nedenstaaende Skema er der, foruden den indtagne Mængde Fedtstof, angivet Mængden af Kulhydrat og Æggehvidestof, dette er dog kun en Beregning foretaget dels med Gennemsnitstal af tidligere her paa Sanatoriet foretagne Analyser, dels med de gængse Gennemsnitstal, desuden findes Calorieværdien angivet.

Ses der paa de enkelte Forsøg, bliver Resultatet:

Forsøgsnummer	Forsøg med	Indtaget			Udskilt					
		Fedtmængde (analyseret)	Æggehvide-mængde (beregnet)	Kulhydrat (beregnet)	Calorieværdi	Absolut Mængde			Procentvis	
					Uforsæbet Fedt i Fac. (analyseret)	Fri Fedtsyre heri udtrykt i Gram H ₂ SO ₄ .	Forsæbet Fedt i Fac. (analyseret)	Uforsæbet Fedt i % af nyt Fedt	Forsæbet Fedt i % af nyt Fedt.	
I	Margarine	455,7	363	818	3029	12,117	0,88	16,110	2,67	3,68
	Smør	458,2	354	805	3006	14,116	1,11	18,771	3,09	4,08
II	Margarine	710,0	433	712	3766	18,37	1,58	23,159	2,62	3,32
	Smør	744,5	471	820	4041	19,382	1,59	30,41	2,60	4,08
III	Margarine	550,4	318	751	3169	13,60	0,91	11,25	2,47	2,04
	Smør	491,4	285	611	2818	10,64	0,72	14,14	2,17	2,88
IV	Margarine	474,4	389	787	3080	40,50	4,35	7,04	8,54	1,18
	Smør	450,0	363	717	2871	36,00	3,89	4,44	8,20	0,99
V	Margarine	667,0	398	611	3446	11,78	0,70	17,22	1,77	2,58
	Smør	622,3	354	643	3286	9,18	0,58	12,56	1,48	2,02
VI	Margarine	515,0	478	619	3097	11,60	1,04	7,18	2,25	1,89
	Smør	591,7	490	740	3513	11,40	0,97	7,00	1,98	1,18
VII	Margarine	367,8	294	770	2591	19,20	1,94	2,86	5,22	0,64
	Smør	447,8	328	862	3015	16,09	1,56	3,10	3,59	0,69
VIII	Margarine	412,7	161	482	2159	4,72	0,42	0,94	1,14	0,23
	Smør	284,2	173	492	1793	4,29	0,25	0,67	1,51	0,24
IX	Margarine	315,6	300	653	2281	9,83	0,62	1,59	3,11	0,50
	Smør	344,4	278	661	2352	13,80	0,91	1,05	4,01	0,80

Forsøg Nr. I (Kontrollforsøget) falder ud til Fordel for Margarinen, idet den indtagne Fedtmængde er lige stor og den udskilte størst for Smørret, træg Afføring de 2 sidste Dage kan dog muligvis have bevirket den lille Difference.

Forsøg Nr. II. Her stiller Forholdet sig nærmest ens; den indtagne Mængde Fedtstof er omtrent lige stor, den udskilte Mængde uforsæbet Fedt omtrent ens og den forsæbede Mængde noget større for Smørret.

Forsøg Nr. III. Ligeledes ens for Smør og Margarine, idet den indtagne

Mængde er lidt større for Margarinens Vedkommende og den udskilte Mængde uforsæbet samtidig størst, medens den forsæbede Fedtmængde er størst for Smørrets. Differencerne er dog saaledes, at de udjævne hinanden.

Forsøg Nr. IV. Her er den udskilte Mængde lidt større ved Margarine, men da den i det hele taget er meget stor (Diarrhoe), bliver Forskellen uden Betydning, hvad der ogsaa fremgaar af Procenttallene.

Forsøg Nr. V. Den indtagne og udskilte Mængde størst ved Margarine. Differencerne er dog ikke større, end man godt kan regne Smørrets og Margarinens Værdi lige, maaske med en ubetydelig Fordel for Smørret.

Forsøg Nr. VI viser en afgjort Fordel for Smørret, idet den udskilte Mængde er lige stor og den indtagne betydelig større for Smør end for Margarine.

Forsøg Nr. VII omtrent som Nr. VI.

Forsøg Nr. VIII. Dette Forsøg viser, hvor lidt der skal til for at forvanske Absorptionsforholdene. Patienten havde Antipathi mod Smørret, som han ansaa for Margarine. Som det ses, er Forbruget af Margarine her betydelig større end Forbruget af Smør, og den udskilte Mængde lige stor. Resultatet bliver altsaa til meget betydelig Fordel for Margarine.

Forsøg Nr. IX. Her er den udskilte Fedtmængde betydelig større for Smør end for Margarine, altsaa en afgjort Fordel for Margarinen.

Betragtes Forsøgene under ét, fremkommer følgende Forhold:

Forsøg Nr. II—IX.

	Indtagen Fedtmængde	Uforsæbet Fedt i Fæces	Forsæbet Fedt i Fæces
Margarine:	4012,9	129,80	71,17
		(3,23 %)	(1,77 %)
Smør:	3976,3	121,62	73,37
		(3,06 %)	(1,85 %)

(Procenttallene angiver Forholdet mellem indtaget og udskilt Fedt).

Den indtagne Fedtmængde for samtlige Forsøg ÷ Kontrollforsøget er omtrent lige stor for Smørret og Margarinen, den udskilte Mængde uforsæbet er lidt større for Margarinens Vedkommende og den forsæbede lidt større for Smørrets. Forskellen er dog saa ringe, henholdsvis 8 Gram og 2 Gram, og tager man i Betragtning, at det er paa en saa stor Mængde (ca. 4000 Gram) indtagen Fedtstof, bliver den faktisk lig Nul; de vedføjede Procenttal viser da ogsaa en ubetydelig Difference, henholdsvis 0,17 % og 0,08 %.

Undersøge vi Forholdene for almindelig Kost:

Forsøg Nr. II, III og IV.

Margarine:	1734,8	72,67 (4,19 %)	41,88 (2,41 %)
Smør:	1695,9	66,86 (3,94 %)	48,99 (2,89 %)

Den indtagne Fedtmængde er omtrent lige stor. Den udskilte udviser en Fordel for Smørret paa ca. 6 Gram uforsæbet Fedt og en Fordel for Margarine paa ca. 7 Gram forsæbet. Deres Værdi er altsaa ens.

Tage vi under ét alle Patienter med Fordøjelsessvækkigheder:

Forsøg Nr. III—IX.

Margarine:	3302,9	111,23 (3,37 %)	47,58 (1,41 %)
Smør:	3231,8	102,80 (3,17 %)	42,96 (1,33 %)

Den indtagne Fedtmængde er omtrent lige stor, den udskilte størst for Margarine saavel for uforsæbet som for forsæbet Fedt. Differencerne er henholdsvis ca. 9 Gram og ca. 4,5 Gram, men betragte vi Procenttallene, se vi, at Differencen er ubetydelig, henholdsvis 0,2 % og 0,11 %.

Tages kun Forsøgene paa »let Kost« og do. + Mælk. faas:

Forsøg Nr. V—IX.

Margarine:	2278,1	57,13 (2,51 %)	29,29 (1,29 %)
Smør:	2290,4	54,76 (2,39 %)	24,38 (1,06 %)

Den indtagne Fedtmængde er atter lige stor, den udskilte udviser en Fordel for Smørret paa 0,12 % for uforsæbet og 0,23 % for forsæbet Fedt.

For Patienter med Hypo-Aciditet viser Forholdene sig saaledes:

Forsøg Nr. III, IV, VIII og IX.

Margarine:	1753,1	68,65 (3,92 %)	20,82 (1,19 %)
Smør:	1570	65,68 (4,18 %)	20,80 (1,29 %)

Den indtagne Fedtmængde er her en Del større for Margarinens Vedkommende end for Smørrets (ca. 180 Gram), den udskilte Fedtmængde er omtrent lige stor, men betragte vi Procenttallene, se vi, at Forsøgene falde ud til Fordel for Margarinen, idet Procenttallene udvise en Difference paa 0,26 % for uforsæbet Fedt og 0,1 % for forsæbet i Favør af Margarine.

Resultatet af disse Forsøg bliver da: For Patienter paa almindelig Kost er Værdien af Smør og Margarine lige stor, for Patienter paa »let Kost« synes Smørret at udnyttes lidt bedre end Margarinen og for Patienter med Hypo-Aciditet det omvendte. Disse Differencer ere dog saa smaa, at de blive uden praktisk Betydning, og de vilde muligvis udjævnes paa en større Forsøgsrække. Hvis man tilmed, som her paa Sanatoriet, giver en Blanding af Smør og Margarine, bliver Forskellen faktisk lig Nul, i al Fald naar Talen er om de gode Margarinesorter, der er anvendt i disse Forsøg.

104-145

OTTO MØNSTED A/s.

TELEGR-ADR.: MØNSTED.

STATSTELEFON Nr. 8.
A. B. C. CODE USED.
TELEFON NR. 3032 & 3035.

N.

AARHUS, DEN 4' Juli 1911.
VESTERGADE 11

P r i v a t .

Herr H. C. Jaster

hersteds.

Iflg. Deres Ønske kunne vi meddele Dem, at vor "Oma"-Plan-
te (Vegetabil) Margarine gennemsnitlig vil findes at indeholde:

Fedt	86.2 %
Vand	10.9 %
Salt	1.7 %
Kvælstofholdige Stoffer	0.7 %
Kvælstoffri Stoffer	0.3 %
Uorganiske Stoffer	<u>0.2 %</u>
	<u>100 %</u> .

Med megen Agtelse

Otto Mønsted A/s.

Oma p to H.C. J.

Den 25 Mars 1911

0	Reder	per	D. J. F.
2	"	"	"
0	"	"	"
4	"	"	"
7	"	"	"
2	"	"	"
<hr/>			

Fatt 15 Reder

[Signature]

Supplement Korthoffelverordnung

104-147

350fd -	87-60	208
	700	
	<u>1760</u>	
	1750	
	<u>10</u>	

	2kr 95fr pnt d.	Halm til Kuling
Frost	- 25-	20 Kuling i
Arbejde	- 04-	hver 10 d. Kuling
Korsel	- 15-	
Halm til Kuling	- 05-	
Fremning af Kuling		
Smit v. Kuling	- 25-	
	<u>3kr 69qr</u>	

Dr. Nielsen leverer og Postens

104-147

Kulby	-	2kr 95fr pnt d.
Frost	-	25-
Arbejde	-	04-
Korsel	-	15-
Halm til Kuling	-	05-
Smit v. Kuling	-	25-
Fremning af Kuling		

3kr 69qr /

3lev

104-147

Tilbud paa Kartofler
til Lindsiggeamtalen ved
Aarhus
i Tidrummet fra 1 Oktober
1911. til 31 Marts 1912
til en Pris af 3 Thr p. Hl.
leveret paa Lindsiggeamtalen.
leveret i Aarhus 2 Thr 85fr
pr Hl.

Erbødigst
N. Lorenzen
Stobmand Deiret
pr. Strubel

139 = 343

109-1917

MEDDELELSE

TIL

Indsørgelsesratet
København

FRA

Christen
Vilberg

Nr. 1000.

Den Forsamling af den Forsatte Person
 Vilberg Indsørgelsesrat, har jeg idag som den i Høstet
 Kredsens som Bræve som jeg tillige af samme Tid
 Meddelte a 250 m Kredsens og 3,95 m Kreds for månedlig
 at Vilberg Vilberg er indført i September. Heroppefter
 Lygner til at blive ølet, og ender ølet, at i de Kredsens
 Kredsens med 1910 angik den Lygner og ender alle indførte
 af Kredsens. For at i øde mig har jeg mit til den for
 Kredsens til i September og Kredsens for den af den
 med Vilberg
 Christen

K O N D I T I O N E R

for

Leverance af Brød til Sindssygehospitalet ved Aarhus

i Januar Kvartal 1914.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.

Der skal leveres det Kvantum Rugbrød, Sigtebrød og Franskbrød, Hospitalet maatte behøve i det anførte Tidsrum.

2.

Brødet skal være vel behandlet og gennembagt og være af friskt, rent og sundt ublandt Mel af bedste Slags. Dejgen skal være æltet paa Maskine.

Rugbrødet maa ikke være over 2 Dage og ikke under 1 Dag gammelt, naar det leveres, ikke dejgrandet, og hvert Brød skal have en Vægt af 5 kg. og være af en bestemt opgiven Form.

Sigtebrødet og Franskbrødet skal være lagt i Mælk og være friskt og nylig bagt, ikke klægt eller dejgrandet. Hvert Sigtebrød skal have en Vægt af 1 kg., hvert Franskbrød en Vægt af 500 gr., og begge Slags Brød skal have en bestemt opgiven Form.

Uantagelige Brød, der er overskaarne, maa Leverandøren tage tilbage uden Godtgørelse.

3.

Leveringen foregaar efterhaanden i saadanne Kvantiteter og til saadanne Tider, som Hospitalets Forvalter bestemmer.

Brødet skal leveres paa selve Hospitalet uden Udgift for dette af Transportomkostninger eller deslige. Leverandøren fritages kun for Transporten - forsaavidt han bor i Aarhus - naar der forlanges leveret mindre Partier end 100 kg. Rugbrød, 10 kg. Sigtebrød eller 4 kg. Franskbrød. I saa Fald bliver Brødet at levere, enten straks ved Rekvisitionens Aflevering eller den paafølgende Dag senest Kl. 10

Formiddag, hos Købmand Jaster i Aarhus.

Leveres et rekvireret Parti Brød ikke til den af Forvalteren bestemte Tid, anskaffes det hos en anden for Leverandørens Regning.

Brødet skal transporteres til Hospitalet i en ren Vogn, dør enten skal være lukket eller forsynet med en ren og tæt Presenning, saa at Regn og Støv ikke kan komme til Brødet. Iagttages dette ikke, kan Hospitalet nægte at modtage Brødet, der saa anskaffes hos en anden for Leverandørens Regning, og Leverandøren skal for hver Gang, en Overtrædelse af denne Bestemmelse finder Sted, betale en Mulkt af 5 Kr. til Patienternes Arbejdsfortjenestes Fond.

4.

Er et leveret Parti Brød ikke konditionsmæssigt og derfor kasseres af Forvalteren, er Leverandøren pligtig til straks at levere antageligt Brød eller finde sig i, at det bliver købt hos en anden for hans Regning.

I Kassationstilfælde kan Leverandøren appellere til Direktionen, hvis Kendelse skal være endelig afgørende.

Er Leverancerne enten i det hele eller for en Del kasserede 3 Gange, har Hospitalet Ret til at anskaffe Brødet for den tilbagestaaende Del af Leverancetiden hos en anden for Leverandørens Regning.

5.

Regning i 2 ligelydende Eksemplarer paa det i hver forløben Maaned leverede Brød skal indsendes til Hospitalets Kontor senest den 3' i den paafølgende Maaned. Efter at Regningen er bleven gennemgaaet, attesteret og anvist, vil Betalingen kunne faas udbetalt paa Kontoret. Brødets Vægt skal anføres paa Regningen i Kilo og Gram.

6.

Med ethvert Parti rekvireret Brød skal følge enten Rekviritionsbog eller Følgeseddel efter nærmere Aftale.

D I R E K T I O N E N for Sindssygehospitalet

ved Aarhus, den 30 December 1913.

P. D. V.

Staller

Undertegnede paatager sig Leverancen af Rugbrød i Januar Kvar-
tal 1914 overensstemmende med foranstaaende Konditioner.

Bagerens Rugbrødfabri

J. Jørgensen

Undertegnede paatager sig Leverancen af Sigtebrød og Fransk-
brød i Januar Kvartal 1914 overensstemmende med foranstaaende Konditio-
ner.

A. P. Christensen